



VIH/SIDA – CASOS DIAGNOSTICADOS E ÓBITOS 2000


Por ocasião do próximo **Dia Mundial da SIDA** (1 de Dezembro de 2001), o **Instituto Nacional de Estatística** (INE) divulga os últimos resultados disponíveis de morbilidade e mortalidade relacionadas com VIH/SIDA.

MORBILIDADE

Segundo a informação disponível mais recente (actualização de 30 de Junho de 2001), do Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis, do Instituto Nacional de Saúde (INSA), em **2000** foram diagnosticados em Portugal **764** casos de SIDA, **155** casos de complexos relacionados com SIDA e **768** casos de portadores assintomáticos.

Casos de SIDA, por ano de diagnóstico e de notificação

Unidade: n.º



No período de Janeiro de 1983 a 30 de Junho de 2001, constata-se a existência de **8232** casos de SIDA, **84%** dos quais correspondem a indivíduos do sexo masculino (**6891**). Em **56%** dos casos de SIDA, os indivíduos afectados já faleceram (**4619**).

O grupo etário com maior incidência, neste período, foi o dos 25 aos 29 anos, com **1832** casos (**22%**), seguido pelos grupos dos 30 aos 34 anos, com **1763** casos (**21%**), e dos 35 aos 39 anos, com **1344** casos (**16%**).


Analisando a distribuição dos casos de SIDA por categoria da doença oportunistas, conclui-se que **45%** dos casos

(**3691**) respeitavam a tuberculose, tendo o falecimento já ocorrido em **1841** desses casos (**40%** do total de óbitos no período).

Segundo dados do Centro Europeu para a Vigilância Epidemiológica da SIDA (Paris), divulgados pelo INSA (actualização de 31 de Dezembro de 2000), a taxa de incidência de SIDA na União Europeia (UE) situava-se, em 2000, nos **22,5** casos por milhão de habitantes. Portugal apresentou a maior taxa de incidência, com **104,2** casos por milhão de habitantes, seguido da Espanha (63,0).

Taxa de incidência de SIDA nos países da União Europeia

Unidade: por milhão de habitantes




MORTALIDADE

Analisando a evolução da mortalidade por VIH/SIDA no período 1988-2000, verifica-se que, de 1988 a 1996, se registou um acréscimo, passando de 62 para 1111 óbitos (cerca de 17 vezes o valor inicial em oito anos); porém, de 1996 a 1998, ocorreu um decréscimo de quase 20%, com 895 óbitos em 1998. Em 1999 (980 óbitos), assistiu-se a uma subida de cerca de 10% face ao ano anterior.

Em 2000, verificaram-se **951** óbitos por VIH/SIDA em Portugal, ou seja, menos 3% que no ano anterior.

Óbitos por SIDA, por sexo

Unidade: n.º




Cerca de **82%** dos óbitos registados por SIDA pertenceram a indivíduos do sexo masculino.

Por grupos etários, verifica-se que **24%** (229) ocorreram em indivíduos com 20 aos 29 anos, **22%** (210) em pessoas com 30 a 34 anos e **19%** (179) em indivíduos com 35 a 39 anos.

Óbitos por sida, por grupo etário

Unidade: n.º



A análise regional do rácio equivalente ao número de óbitos por SIDA por 100 000 habitantes permite concluir que, em 2000, o maior valor se verificou em Lisboa e Vale do Tejo (**17,1**), seguido do Algarve (7,6) e do Norte (7,3). Os menores valores deste indicador pertenceram ao Centro (**1,6**), à Madeira (1,9), aos Açores (2,4) e ao Alentejo (3,4). A nível nacional, o valor deste rácio, em 2000, foi de **8,9**.

Óbitos por sida, por 100 000 habitantes e região

Unidade n.º

